

| <u>UNA SEMANA ANTES:</u> | <u>5 DÍAS ANTES:</u> | <u>1 DÍA ANTES:</u> | <u>1 DÍA ANTES (CONTINUACIÓN):</u> | <u>DÍA DEL PROCEDIMIENTO:</u> |
|--|---|---|---|--|
| <p>Llame a la unidad de procedimientos gastrointestinales al (509) 786-6676 si toma medicina para el diabetes, usa algún tipo de insulina, o tiene condiciones que se enumeran a continuación, ya que es posible que necesitemos modificar su preparación para la colonoscopia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad renal • Diabetes • Válvula cardíaca artificial <p>Transporte: Debido a la sedación que le administrarán durante su procedimiento, no podrá conducir ni abandonar la unidad de procedimientos sin un acompañante. Los taxis no son acompañantes legales.</p> <p>Deje de tomar suplementos que contengan aceites, como aceite de pescado, aceite de krill, etc. durante 1 semana antes de la colonoscopia.</p> <p>Deje de tomar los suplementos de hierro 1 semanas antes de la colonoscopia.</p> | <p>Medicamentos: Si toma anticoagulantes recetados o un inhibidor de plaquetas, como Coumadin (warfarina), Pradaxa, Xarelto, Eliquis o Plavix, consulte con su médico para obtener instrucciones sobre cómo suspenderlos.</p> <p>La aspirina prescrita por un médico no debe suspenderse y debe tomarse según las indicaciones.</p> <p>Deje de tomar los medicamentos Bydureon Bcise, Mounjaro, Ozempic, Trulicity o Wegovy 7 días antes de su colonoscopia.</p> <p>Deje de tomar los medicamentos Byetta, Rybelsus, Saxenda o Victoza el día de su colonoscopia.</p> <p>Compre tabletas de Simeticona (Simethicone) de 125 mg sin receta. Necesitarás 4 tabletas en total.</p> <p><u>3 DÍAS ANTES:</u></p> <p>Dieta: Evite comer semillas, palomitas de maíz y nueces hasta después de su colonoscopia.</p> | <p>Dieta: COMIENCE UNA DIETA DE LÍQUIDOS TRANSPARENTES - NADA de alimentos sólidos, leche ni productos lácteos y nada de jugo con pulpa.</p> <p>Líquidos transparentes aceptables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugo transparente (de manzana, de uva blanca, de arándano blanco, etc.) • Café negro o té (sin crema) • Caldo (sin fideos) • Sodas (de cualquier tipo) • Bebidas deportivas • Gelatina • Paletas de hielo • Ensure Clear (sabor durazno) • Agua de coco <p>EVITE todos los líquidos de color ROJO o PÚRPURA.</p> <p>SUTAB es un tratamiento de 2 días. Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una.</p> <p>Ignore las instrucciones proporcionadas por separado con la preparación SUTAB en sí o por la farmacia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PASO 1 Entre las 4-6 pm, tomar 2 cápsulas de simeticona. • PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Abra el primer frasco de 12 tabletas SUTAB. Tome 2 tabletas cada 10 minutos hasta tomar 12 tabletas. Trague las tabletas con un sorbo de agua y beba toda la cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. • PASO 3 Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas adicionales de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos. • PASO 4 Aproximadamente 30 minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con otras 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos. <p>Beba líquidos adicionales parano deshidratarse.</p> <p>Las respuestas a la preparación varían. Los movimientos intestinales comenzarán de 30 minutos a 6 horas después de ingerir la preparación.</p> <p>La preparación puede causar efectos secundarios tales como distensión abdominal, calambres y náuseas.</p> | <p>No tome los medicamentos para la diabetes. No tome diuréticos como: Lasix (furosemida) y/o hidroclorotiazida (HCTZ).</p> <p>5-6 HORAS antes de salir de casa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tome 2 capsulas de simeticona. • Abra el segundo frasco de 12 tabletas SUTAB. Repita los PASOS 1-4 ANTERIORES. <p>IMPORTANTE: Debe terminar de tomar todas las tabletas de SUTAB y el agua requerida para una preparación completa.</p> <p>Puede seguir tomando líquidos transparentes hasta 3 horas antes de la hora de llegada a su cita.</p> |